



## Informationen zu Epstein-Barr Virus (Pfeiffersches Drüsenfieber)

### Infektionsweg/Übertragung

- Erreger: Herpesvirus
- Übertragung per Tröpfcheninfektion (Husten, Niesen, Sprechen)
- von Mensch zu Mensch

### Inkubationszeit

- 1-3 Wochen

### Symptome

Vielseitig, meist Abgeschlagenheit, Fieber, Schwächegefühl, Appetitlosigkeit

Geschwollene Lymphknoten

### Komplikationen

Verläuft in der Regel ohne Komplikationen  
Bei Folgeerkrankungen können Komplikationen auftreten.

### Schutzimpfung

*Keine*

### Therapie

Bei zusätzlichen Infektionen Therapie mit Antibiotika.

### Verhalten

- Personen, die **an Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt oder dessen verdächtig** sind, sollten **Gemeinschaftseinrichtungen** (Kindergärten, Schulen usw.) **nicht besuchen**.
- **Eltern** sollten die Einrichtungen **informieren**.
- **Es besteht keine Meldepflicht der Einrichtung an das Gesundheitsamt.**
- Der Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung sollte erst nach vollständiger Genesung und nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt erfolgen.
- Ein **ärztliches Attest für die Wiederzulassung** in die Gemeinschaftseinrichtung ist **nicht erforderlich**.

### Besondere Maßnahmen

- Zur Information der Eltern ist ein **Infoblatt auszuhängen**.