

Stand April 2023

Informationen zu Madenwürmern

Infektionsweg/Übertragung

- Fäkal-oral
Durch Kratzen am juckenden After können Eier über die Hände in den Mund gelangen.

Inkubationszeit

- Wenn die Eier in den Mund gelangt sind, dauert es ca 2-3 Wochen, bis sich geschlechtsreife Würmer entwickelt haben. Das Weibchen legt nach der Paarung zwischen 5.000 und 17.000 Eier in den Gesäßfalten des Menschen ab.

Symptome

- Juckreiz am After
- Blässe
- Gewichtsverlust
- i.d.R. keine ernststen Gesundheitsstörungen
- Schlafstörungen
- Appetitlosigkeit
- allg. Unwohlsein

Diagnose

- wird meistens durch den Arzt gestellt anhand der Symptome
- Eier können mikroskopisch nachgewiesen werden.

Therapie

- Einnahme von Wurmmittel (Anthelminthikum)
- Familienmitglieder werden i. d. R. prophylaktisch mitbehandelt.

Verhalten

- Betroffene Personen **dürfen Kindergemeinschaftseinrichtungen weiter besuchen**, entsprechende Hygienemaßnahmen, wie z.B. **adäquates Händewaschen**, sollten vom Betreuungspersonal kontrolliert werden.
- Es besteht **keine Meldepflicht** nach Infektionsschutzgesetz.

Hygienische Maßnahmen

- Nach jedem Toilettengang **Hände** gründlich mit **Wasser und Seife waschen**.
- Ein **Bad am Morgen** entfernt die Eier und Würmer um den After herum.
- **Unterhosen und Bettbezüge** möglichst **täglich wechseln** und bei **mindestens 60°C waschen** (Insbesondere sieben bis 10 Tage nach der Behandlung).
- Betroffene Personen sollten sich die **Fingernägel kürzen**.

Für weitere Fragen: ☎ 06192 201-0

@ hygiene@mtk.org