

Stand Juni 2015

Informationen zu Madenwürmern

Infektionsweg/Übertragung

- Fäkal-oral
Durch Kratzen am juckenden After können Eier über die Hände in den Mund gelangen.

Inkubationszeit

- Wenn die Eier in den Mund gelangt sind, dauert es ca 2-3 Wochen, bis sich geschlechtsreife Würmer entwickelt haben. Das Weibchen legt nach der Paarung zwischen 5.000 und 17.000 Eier in den Gesäßfalten des Menschen ab.

Symptome

- Juckreiz
- Blässe
- Gewichtsverlust
- i.d.R. keine ernsten Gesundheitsstörungen
- Schlafstörungen
- Appetitlosigkeit
- allg. Unwohlsein

Diagnose

- wird meistens durch den Arzt gestellt anhand der Symptome
- Eier können auch mikroskopisch nachgewiesen werden.

Therapie

- kein Problem mit modernem Wurmmittel (Anthelminthikum)
- Familienmitglieder werden oft prophylaktisch mitbehandelt.

Verhalten

- Betroffene Personen dürfen Kindergemeinschaftseinrichtungen weiter besuchen, entsprechende Hygienemaßnahmen, wie z.B. adäquates Händewaschen, sollten vom Betreuungspersonal kontrolliert werden.
- Es besteht keine Meldepflicht nach Infektionsschutzgesetz.

Hygienische Maßnahmen

- Nach jedem Toilettengang Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen.
- Ein Bad am Morgen entfernt die Eier und Würmer um den After herum.
- Unterhosen und Bettbezüge möglichst täglich wechseln und bei mindestens 60°C waschen (Insbesondere sieben bis 10 Tage nach der Behandlung)
- Betroffene Personen sollten sich die Fingernägel kürzen

Für weitere Fragen: ☎ 06192 201-0; -1158; -1877 @ gesundheitsamt@mtk.org