

Stand Juni 2105

## Informationen zu Keuchhusten (Pertussis)

### Infektionsweg/Übertragung

- Erreger: Bordetella pertussis
- Übertragung per Tröpfcheninfektion (Husten, Niesen, Sprechen im Abstand von bis zu ca. einem Meter)
- von Mensch zu Mensch

### Inkubationszeit

- 7-20 Tage
- bei Erwachsenen etwas länger als bei Kindern

### Symptome

3-phasiger Verlauf

#### 1. Stadium catarrhale (Dauer 1-2 Wochen)

- grippeähnliche Symptome
- kein oder nur mäßiges Fieber

#### 2. Stadium convulsivum (Dauer 4-6 Wochen)

- Stakkatohusten (Hustenanfälle, welche zahlreich und oft nachts auftreten)
- Hervorwürgen von Schleim → Erbrechen
- bei ca. 50% typisches Keuchen nach Anfall
- kein bis mäßiges Fieber

#### 3. Stadium decrementi (Dauer 6-10 Wochen)

- allmähliches Abklingen der Hustenanfälle

### Ansteckungsfähigkeit

- vom Ende der Inkubationszeit bis zu 3 Wochen nach Beginn des 2. Stadiums
- bei Antibiotikagabe bis zu 5 Tage nach Beginn der Therapie

### Komplikationen

- treten insbesondere im ersten Lebensjahr auf
- bakterielle Zweitinfektionen können zu Lungen- und/oder Mittelohrentzündungen führen

*sehr selten*

- schwere Gehirnerkrankungen, Krampfanfälle

### Schutzimpfung

*STIKO-Empfehlung*

- für alle Säuglinge ab Vollendung des 2. Lebensmonats
- in Absprache mit Arzt die Impfungen fortführen bzw. auffrischen/nachholen
- für Erwachsene alle 10 Jahre auffrischen
- für **Kontaktpersonen ohne Impfschutz**: Empfehlung einer Chemoprophylaxe (Antibiotikagabe)

### Verhalten

- Personen, die **an Pertussis erkrankt oder dessen verdächtig** sind, dürfen **Gemeinschaftseinrichtungen** (Kindergärten, Schulen usw.) **nicht besuchen**.
- Lehrer/innen, Erzieher/innen oder auch andere **Betreuungspersonen, die an Pertussis erkrankt oder dessen verdächtig sind**, dürfen ihre **Tätigkeit** in Gemeinschaftseinrichtungen ebenfalls **nicht ausüben**.
- **Eltern** müssen die Einrichtungen über die Erkrankung ihres Kindes **informieren**.
- Die **Wiederzulassung in die Gemeinschaftseinrichtung** kann **bei antibiotischer Behandlung 5 Tage nach Beginn der Therapie erfolgen**. Wird **nicht** mit Antibiotika behandelt, so ist die Wiederzulassung **frühestens 3 Wochen** nach Auftreten der ersten Symptome möglich.
- Ein **Ausschluss von Kontaktpersonen** ist **nicht erforderlich**, solange keine Symptome auftreten.
- Ein **ärztliches Attest** für die **Wiederzulassung** in die Gemeinschaftseinrichtung ist **nicht erforderlich**.

### Besondere Maßnahmen

- Die **Gemeinschaftseinrichtung hat das Auftreten** von Pertussis gemäß § 34 Infektionsschutzgesetz unter Angabe von krankheits- und personenbezogenen Daten **unverzüglich** dem Gesundheitsamt **zu melden**.
- Besondere hygienische Maßnahmen sind **nicht erforderlich**.

Für weitere Fragen: ☎ 06192 201-0; -1158; -1877    @ gesundheitsamt@mtk.org