

Stand Juni 2015

Informationen zu Skabies (Krätze)

Infektionsweg/Übertragung

- Erreger: Krätzmilbe
- von Mensch zu Mensch

Inkubationszeit

- 2-6 Wochen

Symptome

- Intensiver, nachts zunehmender Juckreiz
- Unter Umständen erst nach einigen Wochen
- Zackig gewundene Milbengänge
- Nach ca. 5 Wochen feiner, teils blasiger Hautausschlag
- Die Knötchen können monatelang bestehen.

Ansteckungsfähigkeit

- ohne Behandlung
- Ansteckungsgefahr bis zum Abschluss der Behandlung

Komplikationen

- aufgekratzte Milbengänge können sich mit Bakterien infizieren und zu eitrigen Hautentzündungen führen.

Schutzimpfung

- *Keine*
- *Keine Immunität*

Verhalten

- Personen, die **an Krätze erkrankt oder dessen verdächtig** sind, dürfen **Gemeinschaftseinrichtungen** (Kindergärten, Schulen usw.) **nicht besuchen**.
- **Eltern** müssen die Einrichtungen **informieren**.
- Lehrer/innen, Erzieher/innen oder auch andere **Betreuungspersonen, die an Skabies erkrankt oder dessen verdächtig sind**, dürfen ihre **Tätigkeit** in Gemeinschaftseinrichtungen ebenfalls **nicht ausüben**.
- Ein **ärztliches Attest für die Wiederzulassung** in die Gemeinschaftseinrichtung ist **erforderlich**.

Besondere Maßnahmen

- Desinfektionsmaßnahmen sind nicht erforderlich.
- Kleidung, die bis zu 48 Std. vor Therapiebeginn benutzt wurde, sollte bei mindestens 60° C (oder chemische Reinigung) gewaschen werden.
- Zur Information kann ein **Infoblatt ausgehängt werden**.
- Eine Isolierung bis zum Wirksamwerden der Behandlung (24 Stunden nach Beginn) ist zu sichern.

Für weitere Fragen: ☎ 06192 201-0; -1158; -1877 @ gesundheitsamt@mtk.org